

adiCox^{SOL}®

Tekuté
doplňkové
krmivo

AdiFeed[®]

Dobré zásady se vyplácí

adiCox^{SOL}[®]

je koncentrovaná směs přírodních složek (fytoncidů), které podporují funkci imunitního systému, posilující jeho aktivitu proti bakteriálním a protozoálním infekcím. Nezbytná je účinná aktivita fytoncidů v oblasti prevence a kontroly mikrobiálních infekcí, především anareobními bakteriemi a protozoi. Přípravek obnovuje biologickou rovnováhu a správné fungování trávicího systému během a po infekci patogenními původci.

Fytoncidové složky v přípravku

adiCox^{SOL}[®] působí v trávicím systému selektivně:

INHIBUJÍ aktivitu protozoí a bakterií vyvolávajících průjem.

STIMULUJÍ imunitní systém a zvyšují počty lymfocytů a leukocytů.

STIMULUJÍ apetit zesílenou sekrecí kyseliny chlorovodíkové a trávicích enzymů.

ZVYŠUJÍ produkci žluči a zlepšují stravitelnost tuků.

FUNGUJÍ protizánětlivě a posilují sliznici trávicího traktu.

**POZNEJ
SMRTÍCI
SÍLU
FYTONCIDŮ**

**18
BYLINNÝCH
EXTRAKTŮ**

**8
OLEJŮ**

Dávkování

Drůbež:

1 L/1000 L vody nebo 0,1 ml/kg živé hmotnosti

Prasata:

1 L/1000 L vody; **selata:** 0,15-0,25 ml/kg ž. hm.;
výkrm prasat: 0,1ml/kg živé hmotnosti,
vždy po předchozím naředění s vodou (1:10)

Přežvýkavci:

telata 0,1-0,2 ml/kg ž. hm.,
nad 150 kg živé hmotnosti maximální dávka na kus: 15 ml;
vždy po předchozím naředění s vodou (1:10)

Králíci a kožešinová zvířata:

1 L/1000 L vody nebo 0,1 ml/kg ž. hm.

Holubi a okrasní ptáci:

0,1 ml/10 L vody nebo 1 ml/kg ž. hm.

Jako „aperitiv“ na zlepšení trávení a příjem krmiva:

0,1-0,5 L / 1000 L vody po celou dobu

Doporučená doba podávání přípravku: 3 - 5 dní

Složení: 18 standardizovaných bylinných extraktů, 8 stabilizovaných olejů (eukalyptový olej, anýzový olej, česnekový olej, hořčičný olej, hřebíčkový olej, eugenol, thymol, methyl salicylát), glycerol, sorbitol.

Příprava přípravku pro použití:

Před použitím protřepat. V průběhu ředění přípravku chraňte tvář a oči. Přípravek je silně koncentrovaný. Po naředění se stane průzračný, může opaleskovat. Nezachytává se na fitrech medikátorů ani dávkovačů vody.

Interakce:

Lze podávat současně s tekutými acidifikátory a roztoky elektrolytů.

Nepodávat souběžně s biopreparáty.

Zachovat časový odstup min. 3 – 4 hodiny.

Kontraindikace: není

Ochranná lhůta: není

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky v originálním zavřeném balení, 48 hodin po naředění ve vodě.

Skladování:

Skladovat v chladu a temnu. Přípravek nesmí zmraznout. Při teplotě nižší než 10° C přípravek zvyšuje svoji hustotu, aktivní látky mohou krystalizovat. Chraňte před dětmi. V přírodním prostředí podléhá přípravek přirozené biodegradaci.

Balení:

Plastový kanystř 5 L

- pro drůbež, prasata, kozešinová zvířata.

Plastová láhev 1 L

- pro přežvýkavce

Dodává:

BIOFERM®

BIOFERM CZ, spol. s r.o.

Banskobystrická 55, 621 00 Brno

tel: +420 541 422 550, fax: +420 545 247 600

bioferm.cz@bioferm.com

www.bioferm.com

