



adiVigo^{SOL}® PF

Tekuté doplňkové
krmivo pro drůbež

AdiFeed[®]

Dobré zásady se vyplácí



adiVigo^{SOL}® je kombinací rostlinných extraktů účinných především pro zmírnění stresu vyvolaného změnami teplot (horko), které vedou k poruchám elektrolytické rovnováhy a vodní bilance organismu zvířat. Má podpůrný účinek při léčbě poruch gastrointestinálního traktu, odstraňuje účinky narušené absorpce, průjmů a dehydratace. Přípravek zajišťuje udržení homeostázy, která je v souladu s životními funkcemi a fyzikálně chemickými parametry organismu pro udržení vysoké užitkovosti zvířat.

adiVigo^{SOL}® PF ÚČINNÉ SLOŽKY A ZPŮSOB ÚČINKU:

Taniny a flavonoidy **zvyšují** srážlivost krve, stahují a posilují krevní cévy a zastavují drobná krvácení do sliznice trávicího traktu. Utěšňují a posilují epitel vylučovacího ústrojí.

Saponiny, mastné kyseliny a esenciální oleje **posilují** diurézu a čistí ledviny a močovody od minerálně-organických zbytků včetně mikroorganismů.

Fytogenní složky (polyfenoly, taniny, flavonoidy a organické kyseliny) mají **svíravý účinek** na membrány sliznice, tlumí zánětlivé stavy, výpotky a otoky mukózy v trávicím traktu.

Absorbenty a fytoprotekční substance **chrání** střevní klky proti škodlivým účinkům toxinů a mikrobů infikujících alimentární trakt.

Speciálně vybrané minerální látky a rostlinné extrakty fungují jako **inhibitory** fermentačních a hnilobných procesů v trávicím traktu.

Přípravek **urychluje** návrat a nastolení elektrolytické rovnováhy a acido-bazické rovnováhy. To přispívá k **zlepšení** funkce vylučovacího ústrojí a trávicího traktu po infekci patogeny.

Složení:

kyselina fosforečná

Senzorické látky:

rostlinné extrakty: 59,5%; kys. benzoová: 0,3%;
kys. másečná: 0,1%; kys. valerová: 0,4%

Dietetické látky:

kys. askorbová: 10.000 mg/kg;
síran železnatý E1: 1% (Fe 2550 mg/kg)

Technologické látky:

kys. propionnová E280: 1%; kys. mléčná E270: 1%;
laktát vápenatý E327: 1%

Podávání: Přípravek se podává v pitné vodě.

Profylaktické použití (3-5 dnů): v průběhu extrémního horka

Nosnice (produkční a chovné): 1-1,5 l/1000 l vody

Brojeři a krůty: 1-1,5 l/1000 j vody

Vodní drůbež: 0,1-0,2 ml/kg ž.hm.

Podpůrné použití (2-3 dny): stimuluje příjem krmiva, zvyšuje apetýt a reguluje peristaltiku

Nosnice, výkrmová kuřata a krůty: 0,5-1 l/1000 l vody

V případě potřeby je možné aplikaci opakovat po 7-10 dnech.

Příprava přípravku k použití:

Před použitím dobře protřepat. V průběhu ředění přípravku si chraňte tvář a oči, přípravek je vysoko koncentrovaný. Po naředění je přípravek průzračný nebo opaleskující. Neusazuje se na filtrech v napájecích systémech.

Interakce: přípravek může být podáván současně s tekutými acidifikátory a roztoky elektrolytů. Nepodávejte spolu s biopřípravky. Zachovejte časovou prodlevu min. 3 – 4 hodiny.

Kontraindikace: žádná

Ochranná lhůta: žádná

Doba použitelnosti: 2 roky v původním uzavřeném balení, 48 hodin po naředění.

Skladování: skladujte v suchu a chladnu. Nenechte zmraznout. Při teplotách pod 10°C se zvýší viskozita přípravku. Aktivní složky mohou krystalizovat. Chraňte před dětmi. V přirozeném prostředí podléhá přípravek biologické degradaci.

Balení: plastový kanystr 5 l

Dodává:

BIOFERM[®]

BIOFERM CZ, spol. s r.o.

Banskobystrická 55, 621 00 Brno

tel: +420 541 422 550, fax: +420 545 247 600

bioferm.cz@bioferm.com

www.bioferm.com